



COMPOSIZIONE

Acqua depurata, PEG-40 Olio di ricino idrogenato, Sodio cloruro, Potassio sorbato, Fenossietanolo, Sodio ialuronato, Pantenolo, Glicole propilenico, Vitamina E acetato, Sodio fosfato bibasico, Vitamina A palmitato, Sodio fosfato monobasico, Olio essenziale di Eucalipto.

CATEGORIA TERAPEUTICA

Dispositivo medico.

INDICAZIONI

Soluron spray nasale è un dispositivo medico in soluzione isotonica con Acido ialuronico, D-Pantenolo, Vitamina A e Vitamina E, indicato nel caso di secchezza di varia origine e negli stati atrofici della mucosa nasale. Soluron crea un'efficace barriera protettiva nei confronti degli agenti esterni, riepitelizza la mucosa nasale riducendo la formazione di croste a causa della disidratazione del muco o dopo intervento chirurgico. L'Acido ialuronico e il D-Pantenolo consentono di mantenere la mucosa nasale idratata, limitandone la iper-reattività ed agevolando la clearance mucociliare; la Vitamina A svolge un ruolo importante nella neoformazione delle cellule delle mucose e nella riparazione di quelle lesionate; la Vitamina E svolge un'attività emolliente. Soluron è indicato anche nei bambini.

POSOLOGIA

2 spruzzi per narice, 3 volte al giorno.

ISTRUZIONI D'USO

1)Togliere il cappuccio di protezione dall'erogatore; 2)Tenere il flacone verticalmente e posizionare il beccuccio erogatore all'imbocco della narice; 3)Premere con due dita sulla base dell'erogatore; 4)Ripetere l'operazione con l'altra narice; 5)Pulire l'erogatore; 6)Riposizionare il cappuccio di protezione sull'erogatore.

AVVERTENZE

Conservare a temperatura ambiente a riparo dalla luce e fonti di calore. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Evitare di spruzzare negli occhi. In alcuni casi la nebulizzazione può causare un lieve e transitorio senso di irritazione locale.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità accertata verso i componenti. L'uso del prodotto, specie se prolungato, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Flacone da 20 ml con erogatore spray.